









WAS	WOMIT	Menge Einwirkzeit	WIE	WANN	WER?
 Hygienische Händedesinfektion	Septoderm Hände	konz. 30 sec. satt Benetzung	Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalz zu beachten. Merke: Kein Wasser zugeben. Einwirkzeit beachten.	Vor und nach Kundenkontakt. Nach Kontakt mit kontaminierten Material/Gegenständen und Flächen. Nach Toilettenbenutzung.	alle Mitarbeiter
 Händewaschung	Salina		Waschlotion in die Hände geben und gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen. Anschließend Einmalhandtücher verwenden.	Vor Arbeitsbeginn u. nach Arbeitsende. Nach Toilettenbenutzung. Bei sichtbarer Verschmutzung.	alle Mitarbeiter
 Hautdesinfektion	Septoderm Haut	konz. 15 sec.	Hautdesinfektionsmittel bis zur satten Benetzung aufsprühen. Behandlungsstelle unmittelbar mit Papier (z.B. Tupfer) einmal unter leichtem Druck abwischen, ggf. nachsprühen. Haut muß während dem gesamten Applikationszeitraum feucht gehalten werden.	Vor Beginn der Behandlung.	benannte Person
 Instrumente	Perfektan TB	1,0 %-60 min. 2,0 %-30 min. 3,0 %-15 min.	Instrumente in Desinfektionsmittellösung einlegen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen und unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen.	Direkt nach Gebrauch.	benannte Person
 rotierende Instrumente	Desco Bohrerbad	konz. 5 min.	Instrumente in Lösung einlegen. Nach Ablauf der Einwirkzeit trocknen und ggf. sterilisieren.	Direkt nach Gebrauch.	benannte Person
 Flächendesinfektion Waschbecken Fußboden	Cleanisept	2,0 %-15 min. 1,0 %-60 min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Flächen vollständig benetzen.	Täglich. Nach Kontamination.	benannte Person
	Behandlungsbereich	Cleanisept Descosept AF Inventar Wischtuch	2,0 %-15 min. 1,0 %-60 min. konz. 1 min.	Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Einmaltuch nachwischen.	Täglich. Nach Kundenwechsel.
 Schutzkleidung	Mundschutz Schutzbrille Einmalhandschuhe			Bei Aerosolbildung. Bei Aerosolbildung. Bei Bedarf.	benannte Person

Merke



Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten!
Bei Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, deshalb sind Schutzhandschuhe zu tragen!
Desinfektionslösungen sind immer mit maximal lauwarmen Wasser anzusetzen.
Beim Umgang mit Blut sind generell die Hände mit Einmalhandschuhen vor direktem Kontakt zu schützen.

Die Berufsgenossenschaftliche Regel 250 und die RKI-Richtlinie müssen berücksichtigt werden!